

# KÜLSŐLEGES CÍMKÉK

38 x 25 mm

Név: ..... <b>KÜLSŐLEG</b> 20..... Exp.: ..... Felh. i.: ..... év ..... hó ..... nap	Név: ..... <b>KÜLSŐLEG-BEDÖRZSÖLÉSRE</b> 20..... Exp.: ..... Felh. i.: ..... év ..... hó ..... nap	Név: ..... <b>KÜLSŐLEG-ECSETELÉSRE</b> 20..... Exp.: ..... Felh. i.: ..... év ..... hó ..... nap	Név: ..... <b>KÜLSŐLEG-RÁZÓKEVERÉK</b> 20..... Exp.: ..... Felh. i.: ..... év ..... hó ..... nap	Név: ..... <b>KÜLSŐLEG - KENŐCS</b> 20..... Exp.: ..... Felh. i.: ..... év ..... hó ..... nap
---	---	---	---	--

21

22

23

24

27

KÜLSŐLEG  
**Ung. hydrophil. nonionic.**  
Ph. Hg. VII.  
20..... Exp.: .....  
Felh. i.: ..... év ..... hó ..... nap

220

KÜLSŐLEG  
**Ung. emulsific. nonionic.**  
Ph. Hg. VII.  
20..... Exp.: .....  
Felh. i.: ..... év ..... hó ..... nap

221

**Linimentum ad pernionem**  
FoNo VII.  
Külsőleg. Fagybalzsam.  
Ecsetelésre.  
Használat előtt felrázandó!  
20..... Exp.: .....  
Felh. i.: ..... év ..... hó ..... nap

222

55 x 20 mm

Név: .....  
Nasogutta ephedrinii 2%  
FoNo VII.  
**KÜLSŐLEG - ORRCSEPP**  
Naponta 2-3-szor 4-5 cseppet becseppenteni.  
20..... Exp.: .....  
Felh. i.: ..... év ..... hó ..... nap

2101

**Pasta contra solar. hydrophil.**  
FoNo VII.  
Külsőleg. Fényvédő paszta.  
20..... Exp.: .....  
Felh. i.: ..... év ..... hó ..... nap

2102

Név: .....  
**KÜLSŐLEG - FÜLCSEPP**  
Naponta ..... x ..... cseppet  
20..... Exp.: .....  
Felh. i.: ..... év ..... hó ..... nap

25

Név: .....  
**KÜLSŐLEG - ORRCSEPP**  
Naponta ..... x ..... cseppet  
20..... Exp.: .....  
Felh. i.: ..... év ..... hó ..... nap

26

Név: .....  
**KÜLSŐLEG - ORRKENŐCS**  
20..... Exp.: .....  
Felh. i.: ..... év ..... hó ..... nap

261

Név: .....  
**KÜLSŐLEG - SZEMKENŐCS**  
20..... Exp.: .....  
Felh. i.: ..... év ..... hó ..... nap

28

Név: .....  
Nasogutta ephedrinii pro infante  
FoNo VII.  
**KÜLSŐLEG - ORRCSEPP**  
Szopás előtt 1-2 cseppet becseppenteni.  
Naponta ..... x ..... cseppet  
20..... Exp.: .....  
Felh. i.: ..... év ..... hó ..... nap

29

Név: .....  
Nasogutta ephedrinii 1% FoNo VII.  
**KÜLSŐLEG - ORRCSEPP**  
Naponta ..... x ..... cseppet  
20..... Exp.: .....  
Felh. i.: ..... év ..... hó ..... nap

210

Oculogutta .....  
**KÜLSŐLEG - SZEMCSEPP**  
Naponta ..... x ..... cseppet becseppenteni.  
Felbontástól számítva ..... hétig használható fel!  
Sötét, hideg helyen tartandó!  
20..... Exp.: .....  
Felh. i.: ..... év ..... hó ..... nap

211

Név: .....  
20..... Exp.: .....  
Felh. i.: ..... év ..... hó ..... nap

212

Név: .....  
**KÜLSŐLEG**  
20..... Exp.: .....  
Felh. i.: ..... év ..... hó ..... nap

213

**KÜLSŐLEG**  
70%-os HIGÍTOTT ALKOHOL  
TŰZVESZÉLYES  
20..... Exp.: .....  
Felh. i.: ..... év ..... hó ..... nap

**KÜLSŐLEG-BENZIN**  
FOKOZOTTAN TŰZ -ÉS  
ROBBANÁSVESZÉLYES!  
20..... Exp.: .....

215

216

Név: .....  
**KÜLSŐLEG-HINTŐPOR**  
20..... Exp.: .....  
Felh. i.: ..... év ..... hó ..... nap

Név: .....  
**KÜLSŐLEG-KENŐCS**  
20..... Exp.: .....  
Felh. i.: ..... év ..... hó ..... nap

Név: .....  
**Kontaktlencse tároló oldat**  
20..... Exp.: .....  
Felh. i.: ..... év ..... hó ..... nap

217

218

219

**Hydrogel. antiphlog.**  
FoNo VII.  
Külsőleg. Gél napégésre, rovarcsípésre.  
Hűvös helyen tartandó!  
20..... Exp.: .....  
Felh. i.: ..... év ..... hó ..... nap

**Hydrogel. antisudor.**  
FoNo VII.  
Külsőleg. Izzadás elleni gél.  
Sötét, hűvös helyen tartandó!  
20..... Exp.: .....  
Felh. i.: ..... év ..... hó ..... nap

**Hydrogel. refrigerat.**  
FoNo VII.  
Külsőleg. Hűsítő gél.  
Hűvös helyen tartandó!  
20..... Exp.: .....  
Felh. i.: ..... év ..... hó ..... nap

223

224

225

**Oclogutta carbomerae**  
FoNo VII.  
Külsőleg. Műkönyv.  
Hideg helyen tartandó!  
Szükség szerint ..... cseppet a kötőhártya  
zsákba csepegtetni.  
Felbontástól számítva 1 hétig használható fel.  
Felhasználhatósági időtartam: 1 hónap  
20..... Exp.: .....

**Oclogutta gentamicini**  
FoNo VII.  
Külsőleg. Szemcsepp.  
Hideg helyen tartandó!  
Naponta .....x..... cseppet becsepegtetni.  
Felbontástól számítva 1 hétig használható fel.  
Felhasználhatósági időtartam: 2 hét.  
20..... Exp.: .....

**Oclogutta naphazolini**  
FoNo VII.  
Külsőleg. Szemcsepp.  
Hideg helyen tartandó!  
Szükség esetén  
naponta .....x..... cseppet becsepegtetni.  
Felbontástól számítva 1 hétig használható fel.  
Felhasználhatósági időtartam: 1 hónap.  
20..... Exp.: .....

226

227

228

Név:.....  
  
20..... Exp.:.....  
Felh. i.: ..... év ..... hó ..... nap

31

Név:.....  
**KÜLSŐLEG**  
20..... Exp.:.....  
Felh. i.: ..... év ..... hó ..... nap

32

Név:.....  
**KÜLSŐLEG - FELRÁZANDÓ**  
20..... Exp.:.....  
Felh. i.: ..... év ..... hó ..... nap

33

Név:.....  
**KÜLSŐLEG - KENŐCS**  
20..... Exp.:.....  
Felh. i.: ..... év ..... hó ..... nap

34

Név:.....  
**KÜLSŐLEG**  
..... kanállal ..... liter vízhez  
20..... Exp.:.....  
Felh. i.: ..... év ..... hó ..... nap

35

Név:.....  
**KÜLSŐLEG - IZZADÁS ELLEN**  
20..... Exp.:.....  
Felh. i.: ..... év ..... hó ..... nap

36

# BELSŐLEGES CÍMKÉK

38 x 25 mm

Név: .....

Naponta ... szor ... cseppet

20..... Exp.: .....

Felh. i.: ..... év ..... hó ..... nap

41

KAMILLAVIRÁG

20..... Exp.: .....

Felh. i.: ..... év ..... hó ..... nap

42

RICINUS OLAJ

20..... Exp.: .....

Felh. i.: ..... év ..... hó ..... nap

43

55 x 20 mm

Név: .....

Naponta ..... szor ..... szemet

20..... Exp.: .....

Felh. i.: ..... év ..... hó ..... nap

44

Név: .....

Naponta ..... szor ..... kapszulát

20..... Exp.: .....

Felh. i.: ..... év ..... hó ..... nap

441

Név: .....

20..... Exp.: .....

Felh. i.: ..... év ..... hó ..... nap

45

**GLAUBERSÓ**  
5-10 ml-nyi port 2 dl langyos vízben  
oldva, éhgyomorra bevenni.

20..... Exp.: .....

Felh. i.: ..... év ..... hó ..... nap

46

**KESERŰSÓ**  
10-15 ml-nyi port  
2 dl vízben oldva bevenni.

20..... Exp.: .....

Felh. i.: ..... év ..... hó ..... nap

47

CSIPKEBOGYÓ

20..... Exp.: .....

Felh. i.: ..... év ..... hó ..... nap

471

**SENNAE FOLIUM**  
(Szennalevél)

20..... Exp.: .....

Felh. i.: ..... év ..... hó ..... nap

472

**SENNAE FRUCTUS**  
(Szennatermés)

20..... Exp.: .....

Felh. i.: ..... év ..... hó ..... nap

473

PARAFFIN OLAJ

20..... Exp.: .....

Felh. i.: ..... év ..... hó ..... nap

48

SZÓDABIKARBÓNA

20..... Exp.: .....

Felh. i.: ..... év ..... hó ..... nap

49

HÁRSFAVIRÁG

20..... Exp.: .....

Felh. i.: ..... év ..... hó ..... nap

410

KAMILLAVIRÁG

20..... Exp.: .....

Felh. i.: ..... év ..... hó ..... nap

411

70 x 38 mm

Név: .....

Naponta.....-szor.....

..... ml-t bevenni

20..... Exp.: .....

Felh. i.: ..... év ..... hó ..... nap

412

Név: .....

Naponta.....-szor..... ml-t bevenni

étkezés előtt, közben, után.

Sötét, hűvös helyen tartandó!

Használat előtt felrázandó!

20..... Exp.: .....

Felh. i.: ..... év ..... hó ..... nap

413

Név: .....

20..... Exp.: .....

Felh. i.: ..... év ..... hó ..... nap

414

# SZALAGCÍMKÉK

36 x 13 mm

AZ ORVOS KEZÉHEZ!

FOKOZOTTAN TŰZ -ÉS  
ROBBANÁSVESZÉLYES!

TŰZ -ÉS  
ROBBANÁSVESZÉLYES!

CSAK FELNŐTTEKNEK!

FÉNYTŐL VÉDVE TARTANDÓ!

51

Név:.....  
**KÜLSŐLEG - KENŐCS**  
Felh.i.: .....év ..... hó ..... nap  
20..... Exp:.....

52

Név:.....  
**KÜLSŐLEG**  
Felh.i.: .....év ..... hó ..... nap  
20..... Exp:.....

53

HÜVELYKÚP

54

HASZNÁLAT ELŐTT  
FELRÁZANDÓ!

55

56

Felhasználhatósági időtartam  
..... év ..... hó ..... nap

561

ELLENŐRIZTE  
TISZTIGYÓGSZERÉSZ

562

HŰTŐSZEKRENYBEN  
TARTANDÓ!

563

57

VÉGBÉLKÚP

59

HASZNÁLAT ELŐTT  
FELRÁZANDÓ!

591

SÖTÉT, HŰVŐS HELYEN  
TARTANDÓ!

Vizsg. sz.:.....  
Újra ellenőrizendő:  
..... év VI. 30.

510

ÁLLATGYÓGYÁSZATI CÉLRA!

511

ÉLELMEZÉSÜGYI  
VÁRAKOZÁSI IDŐ.....

512

GYERMEKGYÓGSZER

513

514

515

517

38 x 25 mm , 20 x 10 mm

Btto. ....  
Ta. ....  
Ntto. ....



519

520

## NYOMATLAN ÉS EGYEDI CÍMKÉK

36 x 13 mm , 50 x 25 mm , 70 x 38 mm

70 x 36 mm , 50 x 25 mm , 36 x 13 mm

516

518

521

## AZONOSÍTÓ SZALAGCÍMKÉK 50 x 15 mm

**GYÓGSZERTÁR NEVE**  
9999 Város, Utcanév u. 99.  
Tel.: (99) 999-999

**GYÓGSZERTÁR NEVE**  
9999 Város, Utcanév u. 99.  
Tel.: (99) 999-999

101 P

101 K

# KÜLSŐLEGES CÍMKÉK

55 x 20 mm

## Collod. c. acid. salicyl.

FoNo VII.

Külsőleg. Bőrkevényedés ecsetelésére.  
TÜZVESZÉLYES!

Felh. i.: ..... év ..... hó ..... nap  
20..... Exp.: .....

61

## Glycerin. borax.

FoNo VII.

Külsőleg. Bóraxos glicerín. Ecsetelésre.

Felh. i.: ..... év ..... hó ..... nap  
20..... Exp.: .....

62

## Oculogutta atropini

FoNo VII.

Külsőleg. 1%-os atropin-szemcsepp  
Az orvos utasítása szerint.

**M É R E G !**

Felbontástól számítva 1 hétig használható fel!  
Hideg helyen tartandó!

Felh. i.: ..... év ..... hó ..... nap

63

## Oculogutta neomycini

FoNo VII.

Külsőleg. Neomicin szemcsepp.

Naponta .....x 1 cseppet cseppenteni!  
Hideg helyen tartandó!

Felbontástól számítva 1 hétig használható fel!  
Felhasználhatósági időtartam: 2 hét.

20..... Exp.: .....

64

## Pasta zinc. oxyd. salicyl.

Ph. Hg. VII.

Külsőleg. Paszta hámbiány kezelésére.

Felh. i.: ..... év ..... hó ..... nap  
20..... Exp.: .....

65

## Oculogutt. pilocarp. 2%

FoNo VII.

Külsőleg. 2%-os pilocarpin szemcsepp.

**M É R E G !**

Hideg helyen tartandó!

Felbontástól számítva 1 hétig használható fel!  
Felhasználhatósági időtartam: 2 hét.

20..... Exp.: .....

66

## Oculogutt. viscos.

FoNo VII.

Külsőleg. Műkönyv.

Hideg helyen tartandó!

Felbontástól számítva 2 hétig használható fel!  
Felhasználhatósági időtartam: 1 hónap.

20..... Exp.: .....

67

## Oculogutt. pilocarp. 1%

FoNo VII.

Külsőleg. 1%-os pilocarpin szemcsepp.

**M É R E G !**

Hideg helyen tartandó!

Felbontástól számítva 1 hétig használható fel!  
Felhasználhatósági időtartam: 2 hét.

20..... Exp.: .....

69

## Sol. acriflavin.

FoNo VII.

Külsőleg. Száj és torok fertőtlenítésre.

Felh. i.: ..... év ..... hó ..... nap

20..... Exp.: .....

610

## Unguentum nasale

FoNo VII.

Külsőleg. Orrkenőcs.

Hűvös helyen tartandó!

Felbontástól számítva 1 hónapig használható fel!

Felh. i.: ..... év ..... hó ..... nap

20..... Exp.: .....

613

## Detergens sulfuratum

FoNo VII.

Külsőleg. Gyógyszeres sampon

Felh. i.: ..... év ..... hó ..... nap

20..... Exp.: .....

614

## Spiritus salicylatus

FoNo VII.

Külsőleg. 2 %-os szalicilsavas alkohol.

Felh. i.: ..... év ..... hó ..... nap

20..... Exp.: .....

615

## Unguentum boraxatum

FoNo VII.

Külsőleg.

Hűvös helyen tartandó!

Felh. i.: ..... év ..... hó ..... nap

20..... Exp.: .....

616

## Ung. hydrosum

Ph. Hg. VII.

Külsőleg. Kézkenőcs.

Hűvös helyen tartandó!

Felh. i.: ..... év ..... hó ..... nap

20..... Exp.: .....

617

## Ung. alum. acet. tart.

Ph. Hg. VII.

Külsőleg. Hűsítő kenőcs.

Hűvös helyen tartandó!

Felh. i.: ..... év ..... hó ..... nap

20..... Exp.: .....

618

# KÜLSŐLEGES CÍMKÉK

55 x 20 mm

## Unguentum stearini

Ph. Hg. VII.

Külsőleg. Bőrvédő kenőcs.  
Hűvös helyen tartandó!

Felh. i.: ..... év ..... hó ..... nap  
20..... Exp.: .....

619

## Ung. zinc. et alum.

FoNo VII.

Külsőleg. Száritó kenőcs.  
Hűvös helyen tartandó!

Felh. i.: ..... év ..... hó ..... nap  
20..... Exp.: .....

620

## Sol. Castellani sine fuchsin.

FoNo VII.

Külsőleg. Ecsetelésre.

Felh. i.: ..... év ..... hó ..... nap  
20..... Exp.: .....

621

## Spir. salic. c. resorc.

FoNo VII.

Külsőleg. Ecsetelésre.

Felbontástól számítva 1 hónapig használható fel!

Felh. i.: ..... év ..... hó ..... nap  
20..... Exp.: .....

622

## Oculogutt. rifampicini

FoNo VII.

Külsőleg. Szemcsepp.

1-2 cseppet becseppenteni a fertőzés súlyosságától függően 4-8 óránként.

Hideg helyen tartandó!

Felbontástól számítva 5 napig használható fel!  
Felhasználhatósági időtartam: 1 hónap, mélyhűtőben tárolva.

20..... Exp.: .....

641

## Solutio antisudorica

FoNo VII.

Külsőleg. Izzadási ellen. Ecsetelésre.

Felh. i.: ..... év ..... hó ..... nap  
20..... Exp.: .....

624

## Spiritus iodosalicylatus

FoNo VII.

Külsőleg. Ecsetelésre.

Felh. i.: ..... év ..... hó ..... nap  
20..... Exp.: .....

625

## Unguentum ad vulnera

FoNo VII.

Külsőleg. Sebkenőcs.

Hűvös helyen tartandó!

Felh. i.: ..... év ..... hó ..... nap  
20..... Exp.: .....

626

## Unguentum refrigerans

FoNo VII.

Külsőleg. Hűsítő kenőcs.

Hűvös helyen tartandó!

Felh. i.: ..... év ..... hó ..... nap  
20..... Exp.: .....

627

## Cremor aquosus

FoNo VII.

Külsőleg. Krém.

Hűvös helyen tartandó!

Felh. i.: ..... év ..... hó ..... nap  
20..... Exp.: .....

628

## Unguentum emolliens

Ph. Hg. VII.

Külsőleg. Puhítókenőcs.

Hűvös helyen tartandó!

Felh. i.: ..... év ..... hó ..... nap  
20..... Exp.: .....

630

## Unguentum neonatorum

FoNo VII.

Külsőleg. Bőrpoló kenőcs.

Gyermekgyógyász.

Hűvös helyen tartandó!

Felh. i.: ..... év ..... hó ..... nap  
20..... Exp.: .....

631

## Cremor refrigerans

FoNo VII.

Külsőleg. Hűsítő krém.

Hűvös helyen tartandó!

Felh. i.: ..... év ..... hó ..... nap  
20..... Exp.: .....

632

## Tinct. salviae

Ph. Eur.

Külsőleg. Száj és toroköblögetésre.

20-30 cseppet 1 pohár vízhez!

Felh. i.: ..... év ..... hó ..... nap  
20..... Exp.: .....

633

## Tinct. triplex

FoNo VII.

Külsőleg.

20-30 cseppet 1 pohár langyos vízhez gargalizálásra!  
A fogínygyulladás esetén hígítás nélkül kell. ecsetelni.

Felh. i.: ..... év ..... hó ..... nap  
20..... Exp.: .....

634

## Oculogutt. rifampicini

FoNo VII.

Külsőleg. Szemcsepp.

1-2 cseppet becseppenteni a fertőzés súlyosságától függően 4-8 óránként.

Hideg helyen tartandó!

Felbontástól számítva 5 napig használható fel!  
Felhasználhatósági időtartam: 1 hónap, mélyhűtőben tárolva.

20..... Exp.: .....

641

# KÜLSŐLEGES CÍMKÉK

70 x 38 mm

## **Acidum lacticum dilutum**

FoNo VII.

Külsőleg. 15 ml-nyit.  
1 liter langyos vízhez hüvelyöblítésre.

Felh. i.: ..... év ..... hó ..... nap  
20.....Exp.: .....

**71**

## **Alum. acet. tart. sol.**

Ph. Hg. VII.

Külsőleg.  
10-szeres mennyiségű vízzel hígítva, borogatásra.

Felh. i.: ..... év ..... hó ..... nap  
20.....Exp.: .....

**72**

## **Sparsorium antisudoricum**

FoNo VII.

Külsőleg. Izzadás elleni hintőpor.  
Csak felnőtteknek.

Felh. i.: ..... év ..... hó ..... nap  
20.....Exp.: .....

**73**

## **Sparsorium hexachloropheni**

FoNo VII.

Külsőleg. Fertőtlenítő, dezodoráló hintőpor.

Felh. i.: ..... év ..... hó ..... nap  
20.....Exp.: .....

**74**

## **Sparsorium infantum**

FoNo VII.

Külsőleg. Gyermekhintőpor.  
Gyermekgyógyszer.

Felh. i.: ..... év ..... hó ..... nap  
20.....Exp.: .....

**75**

## **Spiritus antirheumaticus**

FoNo VII.

Külsőleg. Bedörzsölésre.

Felh. i.: ..... év ..... hó ..... nap  
20.....Exp.: .....

**76**

## **Suspensio zinci aquosa**

FoNo VII.

Külsőleg.  
Használat előtt felrázandó!  
Hűvös helyen tartandó!

Felh. i.: ..... év ..... hó ..... nap  
20.....Exp.: .....

**78**

# KÜLSŐLEGES CÍMKÉK

70 x 38 mm

## Unguentum infantum

FoNo VII.

Külsőleg. Bőrvédő kenőcs.  
Gyermekgyógyszer.

Felh. i.: ..... év ..... hó ..... nap  
20.....Exp.: .....

79

## Solutio acidi borici 2%

FoNo VII.

Külsőleg.  
Bórsav oldat

Felh. i.: ..... év ..... hó ..... nap  
20.....Exp.: .....

710

## KÜLSŐLEG

### Ung. hydrophil. nonionic.

Ph. Hg. VII.

20.....Exp.: .....

Felh. i.: ..... év ..... hó ..... nap

711

## Hydrog. perox. dil. 3%

FoNo VII.

Külsőleg. Sebkezelésre.  
15 ml-t 1 pohár vízhez; száj- és toroköblítésre.

Felh. i.: ..... év ..... hó ..... nap  
20.....Exp.: .....

712

## Oleum helianthi

Ph. Hg. VII.

Külsőleg.  
Napraforgó olaj

Felh. i.: ..... év ..... hó ..... nap  
20.....Exp.: .....

713

## Ung. antiphlogisticum pro infante

FoNo VII.

Külsőleg. Gyulladáscsökkentő kenőcs.  
Hűvös helyen tartandó!  
Gyermekgyógyszer.

Felh. i.: ..... év ..... hó ..... nap  
20.....Exp.: .....

714

## Gargarisma chlorogenii

FoNo VII.

Külsőleg.

15 ml-nyit 1 pohár vízhez. óránként szájöblítésre.  
Felbontástól számítva 1 hónapig használható fel!

Felh. i.: ..... év ..... hó ..... nap  
20.....Exp.: .....

715

## Gargarisma antiseptica

FoNo VII.

Külsőleg. Szájöblögetésre.

Felh. i.: ..... év ..... hó ..... nap  
20.....Exp.: .....

716



# BELSŐLEGES CÍMKÉK

70 x 38 mm

## **Decoctum saponariae**

FoNo VII.

..... óránként ..... ml-t bevenni.  
Hűvös helyen tartandó!  
Felbontástól számítva 2 hétig használható fel.

Felh. i.: ..... év ..... hó ..... nap  
20.....Exp.: .....

**82**

## **Elixirium thymi compositum**

Ph. Hg. VII.

..... óránként ..... ml-t bevenni.

Felh. i.: ..... év ..... hó ..... nap  
20.....Exp.: .....

**83**

## **Infusum ipecacuanhae**

FoNo VII.

Naponta ..... x ..... ml-t  
étkezés után bevenni.  
Hűvös helyen tartandó!

Felh. i.: ..... év ..... hó ..... nap  
20.....Exp.: .....

**84**

## **Infusum ipecac. pro parvul.**

FoNo VII.

3 éven felüli gyermekeknek.

Naponta ..... x ..... ml-t  
étkezés után bevenni.  
Hűvös helyen tartandó!  
Gyermekgyógyszer.

Felh. i.: ..... év ..... hó ..... nap  
20.....Exp.: .....

**85**

## **Mixtura pectoralis**

FoNo VII.

Naponta ..... x ..... ml-t  
étkezés után bevenni.

Felbontástól számítva 1 hónapig használható fel.

Felh. i.: ..... év ..... hó ..... nap  
20.....Exp.: .....

**86**

## **Solutio pepsini**

FoNo VII.

..... ml-t fél pohár vízben,  
étkezés közben elfogyasztani.  
Használat előtt felrázandó!  
Hűvös helyen tartandó!

Felbontástól számítva 2 hétig használható fel.

Felh. i.: ..... év ..... hó ..... nap  
20.....Exp.: .....

**87**

## **Suspensio terpini**

FoNo VII.

Naponta ..... x ..... ml-t bevenni.

Használat előtt felrázandó!  
Hűvös helyen tartandó!

Felh. i.: ..... év ..... hó ..... nap  
20.....Exp.: .....

**88**

## **Pulvis antidoloricus**

FoNo VII.

Fájdalom esetén ..... port bevenni.  
naponta legfeljebb 3x.

Felh. i.: ..... év ..... hó ..... nap  
20.....Exp.: .....

**89**

# BELSŐLEGES CÍMKÉK

70 x 38 mm

## Emuls. paraff. c. phenolphth.

FoNo VII.

Este ..... ml-t kevés vízzel elkeverve bevenni.  
Használat előtt felrázandó!  
Hűvös helyen tartandó!

Felh. i.: ..... év ..... hó ..... nap  
20.....Exp.: .....

90

## Pulv. chinacisal. c. vit. C

FoNo VII.

Naponta ..... x ..... port étkezés után bevenni.

Felh. i.: ..... év ..... hó ..... nap  
20.....Exp.: .....

91

## Sir. kal. chlorati

FoNo VII.

Naponta ..... x ..... ml-t bevenni.  
Felnőttek részére.

Felh. i.: ..... év ..... hó ..... nap  
20.....Exp.: .....

92

## Sirupus sulfogaiacoli

OGYI-G-21

Naponta ..... x ..... ml-t bevenni.

Felh. i.: ..... év ..... hó ..... nap  
20.....Exp.: .....

93

## Elixirium thymi compositum Sirupus sulfogaiacoli aa.....g

Ph. Hg. VII. - OGYI-G-21

Naponta ..... x ..... ml-t bevenni.

Felh. i.: ..... év ..... hó ..... nap  
20.....Exp.: .....

94

## Susp. bismogel.

FoNo VII.

Naponta ..... x ..... ml-t bevenni.  
Használat előtt felrázandó!  
Hűvös helyen tartandó!

Felh. i.: ..... év ..... hó ..... nap  
20.....Exp.: .....

95

## Emulsio olei jecoris

FoNo VII.

Naponta ..... x ..... ml-t kevés vízzel  
elkeverve étkezés közben bevenni.  
Használat előtt felrázandó!  
Hűvös helyen tartandó!

Felh. i.: ..... év ..... hó ..... nap  
20.....Exp.: .....

96

# SZIGILLUMOK

Ø 18 mm , 25 mm , 45 mm



111 P



112 P



113 P



113 K



112 K



111 K

# ÜVEGZÁRÓ SZALAGOK

80 x 10 mm , 120 x 10 mm , 150 x 15 mm ( Ø 18 mm , 18 mm , 26 mm )

114 P



114 K



115 P



115 K



116 P



116 K

